

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -1-6-66 510816

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN N° 68 de MAI 1966

le 25 Mai 1966

## V I G N E

### AVERTISSEMENT

#### Mildiou :

En raison du développement rapide de la végétation et de l'apparition de taches en divers points du vignoble, un traitement doit être réalisé dans les parcelles où la dernière application est antérieure au 22 mai.

### INFORMATIONS

#### Oïdium :

Ajouter un produit contre l'oïdium à la bouillie anti-mildiou.

#### Pyrale :

L'abondance des "vers" de pyrale justifie souvent une nouvelle intervention.

#### Vers de la grappe :

Des vols ont été observés, en particulier dans la Côte des Blancs et la Montagne de Reims. Il est déjà possible d'appliquer un premier traitement, principalement dans les crus où, en raison de l'absence de pyrale, aucun traitement insecticide n'a été effectué jusqu'à maintenant.

## ARBRES FRUITIERS

### AVERTISSEMENT

#### Tavelure du Pommier et du Poirier :

Renouveler la protection des vergers avant le 28 mai.

### INFORMATIONS

Oïdium du pommier : Ajouter un anti-mildiou aux bouillies

#### Mouche de la cerise :

La première sortie de cette mouche a été observée mais aucune intervention n'est à envisager pour l'instant.

P1...162

AVERTISSEMENT

GRANDE CULTURE

Mildiou de la pomme de terre

Il est conseillé de réaliser sur les cultures de variétés sensibles à cette maladie, un traitement de protection avant le 2 juin.

Les pommes de terre sorties de terre après le 10 mai ne nécessitent pas cette application.

INFORMATIONS

Charançon des siliques sur colzas de printemps

Les concentrations de cet insecte s'accroissent.

Contrairement aux colzas d'hiver tout d'abord envahis par une population d'insectes mâles, les cultures de printemps le sont par des femelles n'ayant pas achevé de pondre et aptes à déposer immédiatement leurs oeufs.

Compte tenu de la défloraison des colzas d'hiver, la plupart des insectes devraient avoir envahi les colzas de printemps avant l'apparition des fleurs.

Eventuellement, effectuer un traitement avant le début de la floraison, ce qui permet de mettre en oeuvre tous les types de produits actifs contre le charançon des siliques.

Selon la réglementation, les traitements antiparasitaires effectués à l'aide de produits toxiques pour les abeilles sont interdits, sur les plantes visitées par ces insectes, pendant la période de pleine floraison.

Noctuelles sur betteraves :

Des dommages occasionnés par les chenilles de noctuelles, les "vers gris", sont localement observés. Surveiller attentivement les cultures, les attaques étant souvent brutales. Intervenir éventuellement, de préférence avec des appâts empoisonnés.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytopathologique de REIMS